

FICHA TECNICA

Frontier® 2X

Dimetenamida - P

Herbicida / Concentrado Emulsionable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Dimetenamida-P: (S)-2-Cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2- metoxi-1-metiletil)acetamida. (Equivalente a 720 g de i.a./L a 20°C)	63.9 %
INGREDIENTES INERTES: Disolvente, surfactante, antiespumante, impurezas y compuestos relacionados	36.1 %
TOTAL :	100.00 %

REG.RSCO-HEDE-0287-303-009-064

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR # 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710 CIUDAD DE
MEXICO.
TEL: 01 (55) 5325-26-00

INSTRUCCIONES DE USO

Frontier® 2X es un herbicida selectivo para controlar maleza de hoja ancha y angosta en los cultivos de PAPA y MAIZ. **Frontier® 2X** es un producto que penetra principalmente por los coleóptilos de la maleza durante la germinación. Controla maleza susceptible reduciendo la división celular y el crecimiento como principal efecto de Dimetenamida-P. La maleza muere antes de germinar o recién emergida.

Frontier® 2X actúa bajo diferentes condiciones climatológicas, proporcionando un periodo de control sin problemas para la rotación de cultivos.

Cultivo	Maleza que control		Dosis L/Ha
	Nombre común	Nombre científico	
PAPA (SL)	Quelite cenizo	<i>Chenopodium album</i>	0.75 a 1.25
	Nabo silvestre	<i>Brassica campestris</i>	
	Lentejilla	<i>Lepidium virginicum</i>	
	Aceitilla	<i>Bidens pilosa</i>	
	Titonia	<i>Tithonia tubaeiformis</i>	

MAÍZ (SL)	Quelite bledo ZACATES Zacate pata de gallo Zacate liendrilla Zacate de agua Zacate pata de gallina Zacate trigoillo	<i>Amaranthus hybridus</i> <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Eragrostis mexicana</i> <i>Echinochloa crus – galli</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Brachiaria plantaginea</i>	1.0-1.25
------------------	--	--	----------

() Intervalo de seguridad = SL - Sin límite.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas después de la aplicación.

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Frontier® 2X es un herbicida que debe aplicarse preemergencia al cultivo y a la maleza. No remueva la tierra durante 30 días después de haber aplicado **Frontier® 2X** ya que reduce su actividad herbicida.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Calibre el equipo de aplicación y asegúrese de que funcione adecuadamente a fin de determinar el gasto de agua y aplicar la dosis correcta. Para la aplicación de la mezcla, verter agua al tanque de mezclas hasta la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la dosis de **Frontier® 2X** según el área a tratar, complete el llenado del tanque con agitación constante para asegurar que la mezcla sea homogénea. Utilice boquillas de abanico plano (8002-8004) procurando que el traslape permita un cubrimiento uniforme del terreno. Realice la aspersión con un mínimo de 300 a 450 L de agua por hectárea para asegurar una buena cobertura.

CONTRAINDICACIONES

Las aplicaciones deben realizarse por la mañana o por la tarde. No aplicar cuando haya amenaza de lluvia o cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h. No permita que el producto sea arrastrado por agua y/o viento hacia otro lugar que no sea el lugar objetivo. **Frontier® 2X** usado a las dosis y bajo las recomendaciones indicadas en esta etiqueta no causa ningún efecto fitotóxico en los cultivos aquí indicados.

INCOMPATIBILIDAD

Frontier® 2X no ha mostrado incompatibilidad al ser mezclado con otros productos agroquímicos oficialmente autorizados. Se recomienda aplicar **Frontier® 2X** solo.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com