



Semevin® 350

Insecticida / Suspensión acuosa

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:
THIODICARB

Composición porcentual:

| Ingrediente activo: | % en peso |
|--|-----------|
| Thiodicarb: Dimetil N,N-[tio bis(metil imino) carboniloxi] bis(etanimidotoato).NO MENOS DE: | 31.5 |
| (Equivalente a 350 g de i.a./L.) | |
| Ingredientes inertes: | |
| Diluyentes y compuestos relacionados. NO MENOS DE: | 68.5 |
| TOTAL | 100.0 |

Categoría toxicológica:
3 Peligro

No. de Registro:
RSCO-INAC-0165-002-008-031

Sistemicidad:

| Sistémico | Contacto | Translaminar | Ingestión |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| | X | | X |

Descripción:

Tratamiento de semilla que protege a los cultivos de maíz, sorgo, soya y algodón durante su germinación y primera etapa de desarrollo, contra plagas tempranas de la raíz como gusano de alambre, gusano cogollero, gusano trozador y gusano saltarín, otorgando una densidad uniforme y plantas sanas, evitando las resiembras.

USOS

| Cultivo | Plaga | | Dosis / 100 kg de semilla |
|---------------|---|--|--|
| | Nombre Común | Nombre Científico | |
| MAÍZ SORGO | Gusano cogollero Gusano trozador Gusano de alambre Gusano saltarín | <i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Agrotis spp.</i> <i>Agriotes spp.</i> <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | 3 a 4 L |
| ALGODÓN | Gusanos trozadores | <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis malefida</i> <i>Euxoa auxiliaris</i> <i>Peridroma saucia</i> | Semilla Semidesbarrada: 1.0 L Semilla Desbarrada: 2.0 L |
| SOYA | Gusanos trozadores | <i>Feltia subterranea</i> <i>Spodoptera ornithogalli</i> <i>Spodoptera praefica</i> | 2.5 L |

() I. de S.: días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 48 h



PRESENTACIONES DISPONIBLES

| |
|--------------|
| 500 ml y 1 L |
|--------------|