

GROWDFEED 20-30-10

Reg. COFEPRIS RSCO-0281/VIII/98

Función:

FERTILIZANTE

Formulación:

SÓLIDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Nitrógeno (N).....	20%
Fósforo (P ₂ O ₅)	30%
Potasio (K ₂ O)	10%
Hierro (Fe).....	0,120%
Manganeso (Mn).....	0,080%
Zinc (Zn).....	0,100%
Cobre (Cu).....	0,060%
Molibdeno (Mo).....	0,001%
Boro (B).....	0,050%
Calcio (Ca).....	0,100%
Magnesio (Mg).....	0,030%
Cobalto (Co).....	0,002%
Azufre (S)	0,050%
Auxinas	0,0020%
Giberelinas	0,002%

Presentación:

Bolsa laminada 1 Kg.

Descripción:

GROWDFEED 20-30-10 es un fertilizante foliar con una formulación que incluye macro y micro elementos además de hormonas vegetales lo que favorece el desarrollo integral de los cultivos dando de inmediato formas fácilmente utilizables de todo lo que necesita la planta, brinda el respaldo que el cultivo requiere para corregir las deficiencias que se presentan o se pueden presentar en momentos críticos para el desarrollo de las plantas.

Mecanismo de Acción:

Los nutrientes en el suelo (N, P y K) pueden estar en estado no asimilable, fijados al complejo arcillo-húmico y en la solución del suelo a la que pasan desde éste. Se establece pues una corriente dinámica de nutrientes desde el complejo arcillo-húmico a la solución del suelo. Dichos nutrientes son extraídos por el cultivo dejando el suelo empobrecido. El **GROWDFEED 20-30-10** contienen distintas concentraciones de los nutrientes esenciales, los productos químicos se presentan en formas iónicas, asimilables por las plantas.

Beneficios y Ventajas:

- Útil en cualquier cultivo
- Estimula el crecimiento general de la planta
- Contribuye a la resistencia de condiciones adversas de clima y enfermedades.
- Totalmente soluble en agua
- Favorece la calidad y productividad del cultivo

Precauciones:

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstelo en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa y manténgala en reposo.

En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado.

Si **GROWDFEED 20-30-10** cayó en los ojos: lavar con abundante agua limpia por al menos 15 min. Consulte a un médico.

En caso de ingestión accidental: enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico.

Si **GROWDFEED 20-30-10** cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

Recomendaciones de uso:

Para aplicación foliar en todo tipo de cultivos. Preparar una solución de aspersión con agua; abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico, la cantidad indicada de **GROWDFEED 20-30-10** y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de los aspersores conteniendo la mitad del volumen de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

Dosis:

CULTIVO	DOSIS Kg/Ha	Época de Aplicación
HORTALIZAS		
Tomate, chile, papa	1 - 2	Al inicio de la floración y comienzo de la fructificación
Melón Calabaza, Sandía, Pepino	1 - 2	La 1era aplicación a los 25 días después de la emergencia la 2da y 3era en floración y fructificación respectivamente.
Fresa	1 - 1.5	Realizar 3 aplicaciones cada 10 días a partir de la floración.
FRUTALES		

Manzano, Nogal, Mango, Cítricos, Aguacate	50g/árbol adulto	Aplicar en floración y desarrollo del fruto en árboles jóvenes aplicar cada 2 meses.
Plátano	3	Hacer aplicaciones bimestrales durante el año
Papaya	0.5 - 1	Hacer aplicaciones cada 2 meses entre cortes.
Piña	4 - 5	Aplicar cada 2 meses posteriores al trasplante
Vid	3 - 4	La 1era al inicio de formación de fruto y posteriormente a los 20 días.
ORNAMENTALES		
Flores	0.5	Realizar 4 aplicaciones durante el ciclo de la planta
Césped	0.5	Realizar 2 a 3 aplicaciones anuales
INDUSTRIALES		
Café	2 - 3	1era en floración y la 2da en formación de las cerezas
Hule	2 - 3	Aplicar cada 2 meses
Cacao, Té	2 - 3	Aplicar cada 2 meses o cada 5 aplicaciones al año
Tabaco	1	Aplicar cada 20 días después del trasplante y después cada 3 semanas
Caña de azúcar	3	La 1era con planta de 0.3m La 2da y 3era con planta de 0.8 y 1m
TEXTILES		
Algodón	3	La 1era al papaloteo y la segunda en formación de bellotas
GRANOS		
Maíz, Sorgo, Mijo	2 - 3	Aplicar durante el embuche y llenado de grano
Trigo, Arroz y Cebada	2 - 3	Aplicar en desarrollo, hoja bandera, embuche y espigamiento.
Frijol, Chícharo Haba	2	Aplicar durante la formación de vainas
OLEAGINOSAS		
Ajonjolí, Jojoba	2 - 3	Aplicar durante el embuche y llenado de grano
Soya	1.5	Aplicar durante la formación de vainas

FORRAJES		
Alfalfa, Trébol, Pastos	2 - 3	Aplicar cada 10 días después de cada corte o pastoreo
FORESTALES		
Cedro, Caoba, Pino, Encino.	0.5 - 1	Cuando los árboles midan 0.50, 0.80 y 1.00 metro de altura.

Nota: Dosis recomendada para cultivos sanos, de preferencia se recomienda consultar con su Agrónomo especialista.

GARANTÍA

Debido a que sale del alcance de BIOCHEM SYSTEMS, S.A. DE C.V. la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto, ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.