

FELINO®

Rodenticida

**INFORMACIÓN GENERAL****MARCA:** Felino®**TIPO DE PRODUCTO:** Rodenticida**INGREDIENTE ACTIVO:** Difacinona**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

FELINO® es un producto para el control de roedores en cultivos de caña de azúcar. Para uso exclusivo en plantaciones de caña de azúcar (*Saccharum officinarum*) para control de rata noruega (*Rattus norvegicus*), rata cañera (*Sigmodon hispidus*, *Sigmodon toltecus*, *Sigmodon hirsutus*, *Sigmodon mascotensis* y *Sigmodon arizonae*) y rata negra (*Rattus rattus*).

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	Plaga	Dosis	Observaciones
Caña de azúcar	Rata noruega (<i>Rattus norvegicus</i>), Rata cañera (<i>Sigmodon hispidus</i> , <i>Sigmodon toltecus</i> , <i>Sigmodon hirsutus</i> , <i>Sigmodon mascotensis</i> y <i>Sigmodon arizonae</i>) Rata negra (<i>Rattus rattus</i>)	De 1 a 3 kg/ha.	Superficie de exposición: 666 a 2000 bloques / ha No. de bloques / punto (En aplicación manual): 4 a 10

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Haga las aplicaciones cuando la población de ratas sea mayor al 5% (es decir 5 ratas atrapadas en un total de 100 trampas o ratoneras / ha). Para mejores resultados haga aplicaciones en el área del cultivo y en zonas aledañas.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Utilice guantes para evitar que los nuggets adquieran olor a humano.

En aplicación manual, coloque 4 a 10 cebos por punto o cebadero. Coloque los cebaderos a intervalos de 7 surcos y con una distancia entre ellos de 5 pasos. En aplicación aérea, calibre el equipo de aplicación.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.