

INSECTICIDA

Spinosad

Insecticida de Origen Natural
Altamente efectivo para el control
de Trips, Larvas de Gusanos,
Minadores de la Hoja y Moscas
de la Fruta con bajo impacto
ambiental y reducido período
a cosecha.



Cirevo®

FICHA TÉCNICA

Para mayor información lea la
etiqueta completa del producto.
Disponible en nuestro website
ascenza.mx



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Spinosad:

Mezcla de spinosina A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil- α -L-mannopiranosiloxi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradexoi- β -D-eritropiranosiloxi)-9-etil-2,3,3a,5a,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahidro-14-metil-1H-8-oxaciclododeca[b]as-indaceno-7,15-diona y spinosina D (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil- α -L-mannopiranosiloxi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradexoi- β -D-eritropiranosiloxi)-9-etil-2,3,3a,5a,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahidro-4,14-dimetil-1H-8-oxaciclododeca[b]as-indaceno-7,15-diona (con un contenido de 87.00% de spinosina A y 13.00% de spinosina D) (Equivalente a 480 g de i .a. /kg)

44.44

INGREDIENTES INERTES:

Dispersantes, anticongelante, modificadores de viscosidad, antiespumante, conservador y solvente

55.56

TOTAL 100.00

CATEGORÍA: Insecticida

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

4 Precaución

REGISTRO:

RSCO-INAC-0101Y-X0708-064-44.44



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **CIREVO®** es un insecticida no sistémico que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos, sobre estimulando sus neuronas motoras, lo que causa contracciones musculares involuntarias, falta de coordinación, parálisis y finalmente su muerte.

- **CIREVO®** es un insecticida a base de Spinosad, ingrediente activo de origen natural derivado de la fermentación de la bacteria *Saccaropolyspora spinosa*. Por su favorable perfil toxicológico y bajo impacto sobre la fauna benéfica, resulta en una excelente herramienta en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

CULTIVOS AUTORIZADOS

CIREVO® se recomienda para el control de plagas, en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Berenjena (1) Chile (1) Jitomate (1) Okra (1)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	75-125 mL/Ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 300-600 L de agua/Ha.
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>)	200-350 mL/Ha	
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	75-100 mL/Ha	
Calabacita (3) Calabaza (3) Chayote (3) Melón (3) Sandía (3) Pepino (1) Brócoli (1) Col (1) Coliflor (1) Col de Bruselas (1) Colinabo (1) Colza (1)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>)	200-250 mL/Ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 300-600 L de agua/Ha.
	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	75-125 mL/Ha	
	Gusano barrenador (<i>Diapania hyalinata</i>)	75-100 mL/Ha	
	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	50- 75 mL/Ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 300-500 L de agua/Ha.
	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	25- 50 mL/Ha	
Ajo (1) Cebolla (1) Cebollín (1) Espárrago (1) Poro (1)	Trips (<i>Trips tabaci</i>)	125-250 mL/Ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 300-500 L de agua/Ha.
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	100-150 mL/Ha	

Nevada Chemicals, SA de CV

Av. Patria 888 3er Piso Interior A Col. Loma Real,

C.P. 45129, Zapopan, Jalisco, México

Teléfono: Lada sin costo 800 88 872 33



ASCENZA®

CULTIVOS AUTORIZADOS

CIREVO® se recomienda para el control de plagas, en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Aguacate (1)	Trips (<i>Scirtothrips perseae</i>)	6.5-8.5 mL/100 L de agua	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 800-1300 L de agua/ha
Nogal pecanero (1)	Gusano barrenador de la nuez (<i>Acrobasis nuxvorella</i>)	10-12 mL/100 L de agua	Realizar una aplicación foliar, al observar los primeros daños en las almendras; volumen de aplicación sugerido 800-1300 L de agua /ha.
	Gusano barrenador del ruezno (<i>Cydia caryana</i>)	8-13 mL/100 L de agua	Realizar una aplicación foliar, al observar los primeros daños en las almendras; volumen de aplicación sugerido 800-1300 L de agua /ha.
Mango (1)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	100-150 mL/Ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 800-1300 L de
Piña (7)	Barrenador del fruto (<i>Thecla basilides</i>)	10-15 mL/100 L de agua	Realizar una aplicación foliar al momento de la eclosión y detección de las primeras larvas; volumen de aplicación sugerido 800-1300 L de agua/ha
Manzano (7) Membrillo (7) Peral (7)	Palomilla del manzano (<i>Cydia pomonella</i>)	75-100 mL/Ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando la inflorescencia se encuentre en estado de cono rojo; volumen de aplicación sugerido 800-1600 L de agua/ha
Arándano (1) Frambuesa (1) Fresa (1) Grosella (1) Zarzamora (1) Kiwi (3)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	75-175 mL/Ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga;
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	100 -150 mL/Ha	
Acelga (1) Apio (1) Espinaca (1) Lechuga (1)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	75-125 mL/Ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 300-500 L de agua/Ha.
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	75-100 mL/Ha	

Intervalo de seguridad: Días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL AREA TRATADA ANTES DE 12 HRS.

Nevada Chemicals, SA de CV

Av. Patria 888 3er Piso Interior A Col. Loma Real,

C.P. 45129, Zapopan, Jalisco, México

Teléfono: Lada sin costo 800 88 872 33